

小心！

蛇出没

我国目前有4种抗蛇毒血清 分别对应不同毒蛇

记者查询国家药品监督管理局发现,截至目前,国内仅有4款抗蛇毒血清,分别为抗蝮蛇毒血清、抗眼镜蛇毒血清、抗五步蛇毒血清、抗银环蛇毒血清,均为赛伦生物旗下产品。

4种抗蛇毒血清,其可对抗的毒素种类各不相同。如果被毒蛇咬伤,认清是哪一类毒蛇,才能使用对症的抗蛇毒血清。

抗蝮蛇毒血清



蝮蛇

蝮蛇的体长通常为60—70厘米,头部略呈三角形,在中国除广东、海南、广西外,均有分布,常栖于平原、丘陵、低山区或田野溪沟、乱石堆。

蝮蛇毒液含血循毒素和少量神经毒素。不同蝮蛇(如短尾蝮、竹叶青)毒性强弱存在差异,但均需紧急处理。



竹叶青蛇

竹叶青蛇体长在300—660毫米,最长个体可达1130毫米。通常,蛇体背及两侧为鲜绿色,腹面为浅绿色。

竹叶青蛇广泛分布于东亚、东南亚以及南亚次大陆等地区,大部分时间栖居在乔木或灌木上。竹叶青蛇毒性较强,处理不当,也会出现危险。

抗眼镜蛇毒血清




眼镜蛇

眼镜蛇体型较大,体长多为0.7—2.5米,蛇头部多呈椭圆形,广泛分布于亚洲和非洲的草原、森林、雨林、灌木林等环境。

眼镜蛇毒性强,其毒液属混合型毒素,既有神经毒,又有血液毒,每年都有许多人因被其咬伤而丧命。

抗五步蛇毒血清



原矛头蝮(烙铁头)

原矛头蝮是蝮科原矛头蝮属的一种具有颊窝的中型管牙类毒蛇,头呈三角形,与颈区分明显,头背棕褐色,具略呈倒V字形的暗褐色斑。

原矛头蝮栖息于海拔1300—2100米的山区、丘陵多草木之处,分布十分广泛,中国长江以南大部分省区均有分布,南岭地区尤为常见。最大放毒量108毫克,对人致死量48毫克(千重)。



尖吻蝮(五步蛇)

尖吻蝮俗称五步蛇,是蝮科尖吻蝮属的中大型管牙类毒蛇。头大,明显呈三角形,吻尖上翘,具颊窝。幼体头背浅褐色,体背粉棕色,尾尖浅黄色,成年后头背呈黑褐色,体背呈棕褐色。在中国广泛分布于长江以南的大部分地区,栖息于潮湿、阴凉的山林中。

尖吻蝮的毒液以血循毒素为主,主要为强烈的抗凝血和抑制血小板聚集的毒素,且排毒量巨大。人被咬后通常伤口红肿、疼痛、流血不止,不久后伤口周围出现血水疱,全身出现内出血(紫癜)。严重者会出现组织坏死、休克,甚至死亡。

抗银环蛇毒血清



金环蛇

金环蛇因有较宽的金黄色环纹而得名,分布于中国云南、江西、福建、广东、广西,常见于潮湿地区或水边。

金环蛇为剧毒蛇类,人被咬后,其创面会出现坏死感染、坏疽、败血症以及创口合并破伤风等症状。在呼吸麻痹后会引发积聚性肺炎、真菌感染等,从而导致受害者死亡。



银环蛇

银环蛇成年个体通常为0.6—1.2米,其最显著的特征是在黑色身体上有数十个白色或银白色的横纹,主要栖息于稻田、灌丛、林缘和村边等处,在中国长江以南大部分省区有分布。

银环蛇毒性非常强,其毒液主要含有神经毒素,可快速影响猎物或威胁者的神经系统,导致瘫痪甚至死亡。



眼镜王蛇

眼镜王蛇是世界上最大的极毒蛇类之一,体长1.5—3米,背部颜色有灰褐色、棕褐色、黑褐色等,颈部背面具有倒V形白斑。

眼镜王蛇分布于东南亚、南亚及东亚,主要生活于平原、丘陵,蛇毒性较强,能很快致命。