

红河屏边 5 只野生小刺猬“回家”



放生野外的 5 只小刺猬 云南红河发布 图

云南大围山国家级自然保护区管护局屏边分局的工作人员,近期放生了 5 只获救助的野生刺猬。

这窝小刺猬是附近的村民在野外发现的,为了让它们得到更好的救护,村民把它们送到云南大围山国家级自然保护区管护局屏边分局,在工作人员的细心照料下,目前,5 只小刺猬已经具备野外放生的条件。

经过细致的前期勘察,工作人员最终选定了大围山腹地一处植被茂密、食物资源丰富且人迹罕至的区域放生。他们精心搭建了舒适的巢穴,同时,还在巢穴周边放置了刺猬喜爱的食物,确保它们能够顺利安家。

刺猬属于国家“三有”保护动物,即具有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物,此次放生行为有助于维护生物多样性和生态平衡。

红河州大围山国家级自然保护区有着“动植物基因库”的美誉,近年来,随着生态环境持续改善,大围山保护区内的野生动物种群数量正逐步增多,这不仅体现了当地生态环境的持续改善,也反映出当地野生动物保护工作卓有成效。

据云南红河发布

大理大学 野生赤狐闯进校园



出现在校园中的赤狐 大理大学 图

6 月 13 日,大理大学学生工作处和农学与生物科学学院发布提示,告知全校师生,校园内发现国家二级保护野生动物赤狐(哺乳纲食肉目犬科)活动的踪迹,提醒师生爱护野生动物,保持距离不打扰,切勿随意投喂,避免近距离接触。

提示说明,保护野生动物是每一位公民的法律责任和道德义务,过度干扰会让赤狐感到压力,影响其正常觅食和栖息。因此请大家切勿出于好奇或喜爱而追逐、围堵、惊吓它们。严禁任何形式的捕捉、伤害或虐待行为。

请勿给赤狐投喂任何食物(包括零食、剩饭剩菜等),赤狐消化道与人类不同,人类投喂的食品大多具有高盐、高糖、高油、含添加剂等特征,可能导致赤狐患消化不良、龋齿等疾病。而野生动物患病难以医治,死亡率较高。同时,投喂会使赤狐依赖人类提供的食物,丧失在自然环境中觅食的能力,一旦中断投食,即面临较大的生存压力。并且,投喂点可能吸引过多动物以及人类聚集,增加疾病在赤狐、其他野生或家养动物间传播的可能性。

提示要求师生与赤狐保持至少 5 米的安全距离,尤其不要试图抚摸或逗弄赤狐。它们可能因感到威胁而激发应激行为,发生抓伤、咬伤人员的事件。特别留意幼崽,如遇赤狐幼崽,切勿靠近或试图触摸。母狐可能就在附近,保护幼崽是其天性,靠近会引发其攻击行为。在赤狐可能出没的区域遛狗、猫等宠物时,请务必牵好宠物绳,避免宠物与狐狸发生冲突。

据大理大学

云南多地 小动物出没

随着生态环境的持续改善,今年夏天,云南多地野生动物进入人类视线,展现出丰富的生物多样性。

德宏盈江 双角犀鸟宝宝振翅出窝



犀鸟宝宝出巢瞬间 朱边勇 摄

6 月 14 日,生态摄影师在云南省德宏州盈江县“中国犀鸟谷”拍摄到国家一级重点保护野生动物双角犀鸟幼鸟出巢的罕见影像。这是在我国境内第 5 次记录到该物种出巢。

当天上午 7 点多,双角犀鸟宝宝开始从巢内向外啄封土。上午 8 点 53 分左右,幼鸟开始侧着身体往巢洞外挤。在半个翅膀挤到洞外后,它再一次仔细观察周围环境。8 点 54 分,它整个身体用力挤出巢洞,奋力挥动着翅膀飞过湍急的大盈江,飞进茂密的雨林中。一对成鸟立即朝幼鸟降落的方向追赶而去。

“这是我国为数不多的双角犀鸟出巢影像,虽然蹲守拍摄的过程非常艰辛、十分煎熬,但能拍摄到这段珍贵的影像我非常兴奋。我们也希望通过这些影像让更多人了解自然、保护自然。”参与本次拍摄的生态摄影贾雷说。

本次拍摄的双角犀鸟雌鸟于今年 2 月 22 日进巢开始孵育幼鸟,整个育雏时长 113 天。“犀鸟的繁育方式比较特别,完成交配后,雌鸟会钻进树洞,用泥巴、果子、粪便把树洞封起来,只留一条小缝用于雄鸟喂食,以确保自己和幼鸟不被黄喉貂、蛇等动物伤害。在幼鸟长得差不多时,雌鸟会‘扒开’洞口飞出巢洞,然后再将洞口封上。幼鸟出巢时,它们也会先‘扒开’巢洞封土、观察环境后才飞离巢洞。”盈江观鸟协会会长班鼎盈介绍。

双角犀鸟是热带雨林的标志性旗舰物种,在科研工作中,雨林保存、保护得好不好,通常会通过这些旗舰物种来进行评价。我国共有 5 种犀鸟,它们在我国的分布范围狭小,德宏州是我国唯一同时有 5 种犀鸟分布的地区,而盈江县的“中国犀鸟谷”是国内唯一有 3 种犀鸟稳定繁殖的地方。

据人民日报客户端



犀鸟宝宝刚好与摄影师对视 高峰 摄